




Herbicidenlijst boomkwekerij		Werking				Toepassing		
Versie 2024-02 10/04/2024		Bodem	Contact	Gras	Systemisch	Maximale dosering middel per ha. per toepassing	Opmerking	Driftreductie
								
Kerb Flo	propyzamide	1 per 12mnd				3,75 L		
Wing P	dimethenamide-P + pendimethalin	1 per 12mnd				4 L	Bloemisterijgewassen maart t/m mei. Laanbomen Jaarrond. Sierheesters, coniferen, Bos en haagpl, vruchtbomen en struiken, rozen, kerstbomen en vaste planten november t/m maart.	Niet met handgedragen spuitapparaat. Grenzend aan opp. Water gehele perceel 90%
Bodemschoon	dimethenamide-P + pendimethalin	1 per 12mnd				4L	Bloemisterijgewassen maart t/m mei. Laanbomen Jaarrond. Sierheesters, coniferen, Bos en haagpl, vruchtbomen en struiken, rozen, kerstbomen en vaste planten november t/m maart.	Niet met handgedragen spuitapparaat. Grenzend aan opp. Water gehele perceel 90%
Springbok	dimethenamide-P + metazachloor	1 per 12mnd				1,7 L	Niet meer dan 1 kg metazachloor (w.s)/ha over een periode van 3 jaar op hetzelfde perceel.	Grenzend aan opp. water gehele perceel 90%
Butisan S	metazachloor	1 per 12mnd				2,0 L	Sultan niet in laanbomen en in sierheesters, coniferen, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, klimplanten, rozen en kerstbomen	Grenzend aan opp. water gehele perceel 90%, in combinatie met een spuitkap
Sultan 500 SC	metazachloor	1 per 12mnd				2,0 L	februari t/m maart	Grenzend aan opp. water gehele perceel 90%
Valdor Expert	loodsulfuron-methyl-natrium + diflufenican	1 per 12 mnd				0,33 kg	Niet in grondwaterbeschermingsgebied. Boomkwekerijgewassen december t/m mei. Alleen in 1 jaar vaststaand gewas	Grenzend aan opp. water gehele perceel 90%
Devrinol 45SC	Napropamide	1 per 12mnd				2,7 L	Boomkwekerijgewassen onbedekt.	grondbehandeling. 300-800 lw/ha
Goltix Queen	metamotron + quinmerac	per teeltcyclus voor opkfst1 na opkfst 3				1 L	Toegestaan in Tagetes als groenbemester onbedekt. In grondwaterbeschermingsgebieden over 2 jaren, slechts gedurende 1 jaar toepassen op hetzelfde perceel.	
Goltix WG	metamitron	3				0,5 - 1 kg	Sierheesters inclusief rozen 10 dgn interval	
		10				0,5 - 1 kg/ha maximaal gebruik 5 kg/ha interval 10 dagen	vaste planten onbedekte teelt	
		5				0,5 - 2 kg	Tagetes na opkomst 7 dgn interval	
Goltix SC	metamitron	3				0,5 - 1 L	Sierheesters inclusief rozen 10 dgn interval	
		5				0,5 - 2 L	Tagetes na opkomst 7 dgn interval	
Boxer	Prosulfocarb	1 per 12mnd				5 L	ALLEEN IN MAART. Tijdens vegetatieve rustperiode tussen het gewas.	90%
Oblix 500 SC	Ethofumesaat	2 per 12mnd				0,6 L	Toepassen met 200 - 300l water/ha	

Dit herbiciden overzicht is met zorg samengesteld en is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en de samensteller is niet verantwoordelijk voor het gebruik van beschreven middelen.

Herbicidenlijst boomkwekerij		Werking				Toepassing						
Versie 2024-02 10/04/2024						Bodem	Contact	Gras	Systemisch	Maximale dosering middel per ha. per toepassing	Opmerking	Driftreductie
AZ 500	Isoxaben		1 per 12 mnd						0,5 Ltr Bij 0,15 Ltr 2 toepassingen per 12 mnd	via St Trustee. Kleine toepassing. Spuiten in 100 - 400 Lw/ha. Niet in grondwaterbeschermingsgebied. Alleen toepassen op de zwartstrook	DRT 90% hele perceel	
Kontakt 320 SC	fenmedifam		1 per 12 mnd						3 L	Beperkt etiket, gezaaide boomkwekerij gewassen onbedekt. April t/m juni	Aantal toepassingen in Tagetes 2x	
Astrix EC	fenmedifam		1,2						3 - 6 L	Tagetes 2x 2 ltr/ha, Rozen 2x 3 ltr/ha; Gezaaide boomkwekerij gewassen onbedekt. 1x 6 ltr/ha	Bij toepassing enkelvoudige dosering (6L) in gezaaide boomkwekerijgewassen op percelen grenzend aan opp. water 90%. Niet handmatig. Spuitvloestof moet blijven bewegen	
Corzal	fenmedifam		2						4 - 6 L	Roos 2x 3 ltr/ha. Tagetes 2x2L/ha. April t/m juni	Niet handmatig toepassen	
Corzal SE	fenmedifam		6 per 12mnd						1 tot 2L met een maximum van 6L per seizoen	Boomkwekerijgewassen onbedekt		
Ultima	Maleinehydrazide + Nonaanzuur		2 per 12mnd						320 L	Boomkwekerijgewassen en vaste planten onbedekte teelt	1,6 ltr/10 lw = 100m2 SKAL erkend alleen toepassen met rugspuit+spuitkappen, motorspuit met enekele spuitdop+kap. Of machinaal sensor gestuurd.	
Quickdown	pyraflufen-ethyl		2 per 12 mnd						0,8 L	Beperkt etiket vaste planten 300-400l water/ha, hazelnoot, kastanje en walnoot 140-400L water/ha	Op perceelsstroken grenzend aan opp. water eerste 14m 90%. Perceelsstroken niet grenzend aan opp. water eerste 14m 50%	
Sencor SC	Metribuzin		1 of 3						0,15/0,25 - 0,75 L	Bos en haagplatoen. Niet meer als 0,75 L per jaar in 1 of 3 keer toepassen.	Niet handmatig toepassen, Niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Grenzend aan oppervlaktewater 75%	
Centurion Plus	clethodim		1 per 12mnd						2,0 L	straatgras rijntoepassing voor en na opkomst. Vaste planten na opkomst 1 jarige grasachte onkruiden, straatgras en kweek	Teeltvrije zone 150 cm 90% Teeltvrije zone 225 cm 75% Of met andere apparatuur anders, zie etiket	
Targa Prestige	quizalofop-P-ethyl		1 per 12mnd						1 - 3 L	Maximaal 3L per teeltcyclus	Niet handmatig toepassen. 95% gehele perceel. Alleen bij een maximale bodembedekking van 40%	
Pilot	quizalofop-P-ethyl		1 per 12 mnd						1 - 3 L	Maximaal 3L per teeltcyclus	Niet handmatig toepassen. 95% gehele perceel. Alleen bij een maximale bodembedekking van 40%	
Fusilade Max										Niet meer toegelaten boomkwekerij		
Agil 100 EC	propaquizafop		1,2						0,75 - 1,2 L	75 - 300L water/ha., uitsluitend toepassen met machinaal voortgetrokken veldspuit. In groenbemesters	Niet handmatig. Gehele perceel 97,5%. Of met andere apparatuur zie etiket	
Focus Plus	cycloxydim		1 per 12mnd						1 - 5 L	200 - 400L water/ha		

Dit herbiciden overzicht is met zorg samengesteld en is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en de samensteller is niet verantwoordelijk voor het gebruik van beschreven middelen.

Herbicidenlijst boomkwekerij		Werking				Toepassing		
		Bodem	Contact	Gras	Systemisch	Maximale dosering middel per ha. per toepassing	Opmerking	Driftreductie
Versie 2024-02 10/04/2024								
Etna, Klaverblad Glyfosaat, Clinic N, Glyfall, Glyfophgan Allround, Catamaran, Roundup, Roundup Evolution, Roundup Extra, Roundup Tempor,	glyfosaat 360 gr/l				1 1 1	0,4 L 2 - 3 L 2 - 3 L	Pleksgewijs spuiten Groenbemesters Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden	Zie etiket
Catamaran Plus, Glyfall Plus, Rodeo Plus,	glyfosaat 360 gr/l				1 - 2 2	1,5 - 3 L 1,5 - 3 L	behandeling na de oogst, voor het planten of zaaien van gewas. En na het zaaien/planten, voor opkomst Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden	Zie etiket. Maximaal 3 L/ha Zie etiket
Roundup Pro, Roundup Star, Roundup +, Garwin, Viking	glyfosaat 360 gr/l				1 1 1 1	0,3 L 3 L 3 L 2 - 3 L	Pleksgewijs spuiten groenbemesters Kerstbomen Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden	Zie etiket
Roundup max Roundup Ultimate	Glyfosaat 450 gr/l Glyfosaat 450 gr/l				1 1 2	0,24 L 2,4 L 1,5 - 2,4 L 0,22 L	Pleksgewijs spuiten Groenbemesters Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden Pleksgewijs spuiten	Zie etiket Zie etiket
Roundup dynamic	Glyfosaat 500 gr/l				1 2 1 1 1 2	3,2 L 1 L 0,22 L 4,3 L 2,1 L 3,2 L	Behandelen voor zaaien/planten of opkomst strokenbehandeling in laanbomen, sierheesters (incl rozen), coniferen en kerstbomen, bos en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken en vaste planten Pleksgewijs spuiten Groenbemesters Kerstbomen Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v akkerranden	Zie etiket
MCPA*	MCPA				1	3,6 L / ha. zwartstrook	Strokenbehandeling	Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.
Vivendi 100 Damine 500	Clopyralid 2,4-D				1 of 2 1	1,2 of 0,5 ltr 2-3 L	samengesteld bloemige en distels. 1 maal per jaar 1,2 ltr en 2 maal per jaar 0,5 ltr Grasachtige groenbemesters. Niet tussen 1 sept en 1 maart	in grondwaterbeschermingsgebied mag het middel niet worden gebruikt tussen 1 sept en 1 maart. Toepassen in 200 - 400l water/ha. Niet gebruiken tussen 1sept en 1maart
Primus	florasulam				1	99 ml	Eenjarige breedbladige	Toepassen met 200 - 400l water/ha. Alleen met een machinaal getrokken veldspuit.
Genoxone ZX (Garlon) Cleave Titus	2,4-D + Triclopyr Fluroxypyr-meptyl + Florasulam Rimsulfuron				1 2 1	1,25% 12,5 ml/liter water 0,75 L 0,04 kg	Onbeteeld terrein. Niet tussen 1 sept en 1 maart Behandeling tussen de rijen. Bodemtoepassing tussen de gewasrijen.	1 liter spuitvloeistof is voor 20m2. In grondwaterbeschermingsgebieden en op onbeteelde terreinen niet tussen 1sept en 1maart Toepassen in voorjaar of zomer.
Laudis	praziquantel				1	100-400 water	op 100-400 water	Toepassen niet meer dan 1 maal per jaar voor het gebruik van beschreven middelen.
* Meerdere merken, per etiket kan dosering afwijken		Aantal toepassingen						