

## Toelatingen in de teelt van pruimen

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (januari 2025). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden. Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst ([www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl)) of uw voorlichter. Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.)

### TOELATINGEN IN DE TEELT VAN PRUIM 2025

Plaag / ziekte	Middel	Dosering per hectare	VT* (dg)	Actieve stof	Opmerkingen	B*
Bladluizen	Pirimor 5794 N (W.12)	0,5 kg	7	pirimicarb	2 toepassingen met 7 dagen interval. Te gebruiken in de bloei. Door driftbeperkingen bij watergangen nauwelijks bruikbaar. <b>Niet toegelaten binnen de bedekte teelt</b> Uitverkoop Q1 2026, opgebruik Q2 2026	B
	Movento 13404 N (W.7)	0.75 ltr	21	spirotetramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt. Trage aanvangswerking!</i> <i>Let op met drifteisen voor alle percelen, 95% DRT, met 4,5 meter teeltvrij. Opgebruik 30-10-2025</i>	B
	Batavia 15615 (W.6)	1,1 ltr	21	spirotetramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt. Trage aanvangswerking! Een SC formulering.</i> Opgebruik 30-10-2025	
	Teppeki 12757 (W.12)	140 gram	21	flonicamid	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen, dan alleen na zonsondergang toepassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Max. 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval	
	Afinto 16104 (W.3)	140 gram	14	flonicamid	Zie Teppeki, zelfde werkzame stof, alleen andere fabrikant	
	NeemAzal-T/S 12455 (W.7)	3 liter vóór 1 mei en 4,5 liter na 1 mei	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. <b>Voor 1 mei</b> max. 3 ltr/ha, <b>na 1 mei</b> max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
Groene appelwants	Promanal HP 16278 N (W.-)	30 ltr	-	Paraffineoliën	<b>Alle teelten.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	30 ltr	-	Paraffineoliën	<b>Alleen onbedekte teelt.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B

Pruimenzaagwesp					Geen middelen toegelaten. Hopelijk weer een vrijstelling voor Gazelle!	
Rupsen en motten (Pruimenmot)	Coragen 13555 N (W.3)	175 ml	14	chlorantraniliprole	Maximaal twee toepassingen per seizoen, met een interval van 14 dagen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt!</b>	B
	XenTari WG 12437 N (W.4)	1,5 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	<b>Alleen onbedekte teelt</b> , 10 toepassingen met 6 dagen interval.	B
	Dipel DF 14674 N (W.1)	1,5 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 8 toepassingen met 6 dagen interval, geen VT	
	Costar WG 15885 N (W.1)	0,3 – 1 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT	
	NeemAzal-T/S 12455 N (W.7)	3 liter vóór 1 mei en 4,5 liter na 1 mei	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. <b>Voor 1 mei</b> max. 3 ltr/ha, <b>na 1 mei</b> max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
	Lalguard M52 OD 14883 (W.1)	1,8 ltr	4 uur	Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52	<b>Bedekte teelt</b> is 10 toepassingen met 3 dagen interval <b>Onbedekte teelt</b> is 6 toepassingen met 7 dagen interval Nevenwerking op spint(mijten), trips en witte vlieg	
Pruimenmot en Suzuki fruitvlieg	Minecto One 16589 N (W.-)	0,19 kg	7	cyantraniliprole	<b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> Toegelaten na de bloei! <b>Dit middel mag eens in de 3 jaar toegepast worden!</b> Toepassen met minimaal DRT 97,5 en alleen tussen 1 mei en 31 juli. Werkt ook goed op rupsen. <i>Het middel mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden!</i>	B
	Exirel 16748 N (W.-)	0,6 ltr	7	cyantraniliprole	<b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> Toegelaten na de bloei! <b>Dit middel mag eens in de 2 jaar toegepast worden.</b> Toepassen met DRT 95 en 450 teeltvrij of bij kleiner dan 450 cm teeltvrij minimaal 97,5 DRT. Werkt ook goed op rupsen. <i>Het middel mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden</i>	B
Spint – en roestmijten	Cantack 12939 N (W.5)	0,9 ltr	21	acequinocyl	Maximaal 1 toepassing per seizoen, <b>alleen toegelaten voor de onbedekte teelt</b> , toepassen met minimaal 90% DRT!	B
	Scelta 13440 (W.8)	1 ltr	-	cyflumetofen	<b>Toegelaten na de oogst, zowel voor de bedekte en onbedekte teelt</b> , maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval	B
	Vertimec Gold 13087 N (W.11)	1,1 ltr	28	abamectine	<b>Alleen toegelaten voor de bedekte teelt!</b> Het middel niet vaker dan <u>twee keer</u> , per teeltcyclus toepassen. Het minimale interval is 10 dagen.	B
	Botanigard WP 12612 (W.4)	0,625 kg	1	Beauveria bassiana	Maximaal 25 toepassingen met een interval van 5 dagen. <b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt</b> , werkt ook op trips	
	Botanigard Vlb. 12612 (W.4)	1,25 ltr	1	Beauveria bassiana	Max. 25 toepassingen met een interval van 5 dagen. <b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt</b> , werkt ook op trips	

	Futureco Nofly WP 16266 (W.4)	2,5 kg	1	Paecilomyces fumosoroseus stam Fe9901	<b>Alleen toegelaten in de bedekte teelt.</b> Max. 4 toepassingen per seizoen, met 5 dagen interval. Op het etiket staat tegen Witte vlieg en Trips.	
	Oroganic 15958 (W.2)	8 ltr	1	Sinaasappelolie	<b>Alleen toegelaten in de bedekte teelt.</b> Max. 11 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval. Werkt ook op bladluis en meeldauw	
	Neudosan 16452 (W.-)	14 ltr	-	vetzuren en kaliumzouten	Groen middel, <b>alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> Maximaal 5 toepassingen met 5 dagen interval. Geen VT.	
	Eradicoat Max 16056 (W.1)	30 ltr	-	maltodextrine	Groen middel, <b>alle teelten!</b> Maximaal 5 toepassingen met 3 dagen interval. Geen VT. Opletten met intensief toepassen!	
	Siltac SF (Protac)	0,6 ltr	-	siliconenpolymeren	Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter water	B
	Stix	1 – 1,5 ltr	-	siliconenpolymeren	Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting uitvoeren, bij voorkeur toepassen met maximaal 500 liter per hectare. De maximale dosering is 0,3%.	B
	Promanal HP 16278 N (W.-)	30 ltr	-	Paraffineoliën	<b>Alle teelten, tegen fruitspintmijt.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	30 ltr	-	Paraffineoliën	<b>Alleen onbedekte teelt.</b> Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B
Pruimenroest	Folicur SC 13057 N (W.7)	450 ml	7	tebuconazool	Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval, <b>bedekte en onbedekte teelten.</b> 1 <sup>e</sup> toepassing BBCH 57-69, 2 <sup>e</sup> toepassing BBCH 71-85. <b>Niet in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Folicur WG 11765 N (W.9)	0,75 kg	7	tebuconazool	Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval, <b>bedekte en onbedekte teelten.</b> 1 <sup>e</sup> toepassing BBCH 57-69, 2 <sup>e</sup> toepassing BBCH 71-85. <b>Niet in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Belanty 16459 N (W.-)	1,8 ltr	3	mefentrifluconazool	Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval, <b>alleen onbedekte teelt.</b> Voor 1 mei 99 DRT, na 1 mei 95 DRT. <b>Maximaal 1 toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Luna Experience 14777 N (W.3)	600 ml	7	fluopyram + tebuconazool	<b>Etiket: vruchtrot, werkt ook op tak- en bloesemsterfte.</b> Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
Hagelschotziekte	Kumulus S (6147 N W.8)	6 kg (max. 7,5 kg) <b>Na de bloei, (Max. 6 kg)</b>	7	zwavel	<b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> Vóór 1 mei, alleen toepasbaar middels een DRT 99% techniek. Max. 2 toepassingen met 10 dagen interval. Na 31 mei van het betreffende jaar mag het middel niet meer toegepast worden!!	B
	Thiovit Jet (5395N W.8)	5 kg (max. 7,5 kg)	-	zwavel	<b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> 1 toepassing voor de bloei toegelaten (7,5 kg/ha), maar wel 99% DRT. Ook 1 toepassing na de bloei toegelaten (6 kg/ha). Thiovit Jet mag toegepast worden tot en met juli van het betreffende jaar.	B

	Microthiol Special Liquid (16371 N W.1)	7,3 ltr	-	zwavel	<b>Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</b> Toegelaten vanaf 1 mei tot eind juli. Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval. Met DRT 95 en 450 cm teeltvrij of DRT 97,5 bij <dan 450 cm teeltvrij	
Tak- en bloesemsterfte en vruchtrot	Signum 12630 N (W.20)	0,75 kg	7	pyraclostrobin + boscalid	Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval. Met drift-bepalingen bruikbaar voor 1 mei. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Teldor 12130 N (W.7)	1,5 kg	3	fenhexamid	Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. <i>Voor 1 mei beperkingen, maar wel bruikbaar.</i> <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Captan <b>Malvin</b> 6782 (W.15)	2,25 kg	21	captan	Maximaal 4 toepassingen met een interval van 10 dagen tussen de toepassingen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Folicur SC 13057 N (W.7)	450 ml	7	tebuconazool	<b>Toegelaten voor bedekt en onbedekt.</b> Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval. 1 <sup>e</sup> toepassing BBCH 57-69, 2 <sup>e</sup> toepassing BBCH 71-85. <i>Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebied</i>	B
	Belanty 16459 N (W.-)	1,8 ltr	3	mefentrifluconazool	Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval, <b>alleen onbedekte teelt.</b> Voor 1 mei 99 DRT, na 1 mei 95 DRT. <b>Maximaal 1 toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Switch 12819 N (W.8)	1 kg	7	cyprodinil + fludioxonil	Breedwerkend schimmel middel, met name sterk op Botrytis en Colletotrichem. <b>Bij watergangen geen toelating voor 1 mei.</b> <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt.</b> Maximaal 3 toepassingen met 10 dagen interval	B
	Geoxe (Safir) 14414 N (W.4)	450 gr	7	fludioxonil	<b>Alleen onbedekte teelt.</b> Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. Dit middel bevat de fludioxonil uit Switch, dus werkzaam op vruchtrot middels 1 werkzame stof.	
	Flint 12289 N (W.12)	150 gr	7	trifloxystrobine	Maximaal 2 toepassingen, met 7 dagen interval <b>Alleen onbedekte teelt,</b> tevens nevenwerking op roest	B
	Serenade 14536 N (W.8)	5 – 8 ltr	-	Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713	Biologisch fungicide. Maximaal 6 toepassingen met een interval van 5 dagen. Bij voorkeur toepassen met een uitvloeier. <b>Alleen onbedekte teelt.</b>	
	Taegro 15794 N (W.2)	0,37 kg	4 uur	Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	Biologisch fungicide. Maximaal 12 toepassingen met 3 dagen interval. <b>Alle teelten</b>	
	Amylo-X WG 16011 N (W.1)	2,5 kg	1	Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	Biologisch fungicide. Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval. <b>Alle teelten</b>	
	Serifel 15888 N (W.2)	0,5 kg	-	Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600	Groen middel. Maximaal 10 toepassingen met 7 dagen interval. <b>Alleen onbedekte teelt.</b> Geen VT.	
	Luna Experience 14777 N (W.3)	600 ml	7	fluopyram + tebuconazool	<b>Etiket: vruchtrot, werkt ook op tak- en bloesemsterfte.</b> Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B

	Luna Privilege 13832 N (W.7)	150 ml	14	fluopyram	<b>Etiket: meeldauw, maar werkt ook op tak- en bloesemsterfte.</b> Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. <b>Niet toegelaten in de bedekte teelt</b>	B
	Fado (onbedekt) 14921 N (W.4)	2 ltr	3	COS-OGA	Groen middel, voor de <b>onbedekte teelt</b> , maximaal 8 toepassingen met 8 dagen interval en 3 dagen VT. <i>Bij voorkeur toepassen in menging of in een spuitschema</i>	
	Fado (bedekt) 14921 N (W.3)	3 – 4 ltr	-	COS-OGA	Groen middel, voor de <b>bedekte teelt</b> , maximaal 5 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT.	
	Vacciplant 13383 N (W.3)	1 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de <b>onbedekte teelt</b> , maximaal 20 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Vacciplant 13383 N (W.3)	0,75 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de <b>bedekte teelt</b> , maximaal 7 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Karma 13854 N (W.7)	5 kg	1	kalium waterstofcarbonaat	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, <b>biologisch middel, voer altijd een proefbespuiting uit!!</b> Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval	
	Vintec 15689 N (W.3)	200 gr	-	Trichoderma atroviride strain SC1	Biologisch fungicide. Maximaal 2 toepassingen na de snoei met 7 dagen interval en maximaal 8 toepassingen tegen vruchtrot met 7 dagen interval. <b>Alleen onbedekte teelt.</b>	
	Problad 16572 N (W.-)	3,2 ltr	-	Extract van Lupinus albus	Groen middel, ter ondersteuning van andere middelen. Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. <b>Alleen onbedekte teelt.</b>	
Onkruid	Agil 100 EC 15291 N (W.2)	1 ltr	30	propaquizafob	Alleen werking op grassen. Maximaal 1 toepassing per seizoen, op kweekgras wel 2x met max. 0,75 ltr/ha. <b>Niet toegelaten in tunnels en kassen</b>	B
	AZ 500 15264 N (W.2)	0,3 ltr	-	isoxaben	Na oogst toepassing, toepassen in de herfst of <b>winter</b> , maximaal 1 toepassing per seizoen, <b>niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden</b>	B
	Quickdown 13246 N (W.5)	0,8 ltr	-	pyraflufen-ethyl	Alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg bij de toepassing 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe.	B
	Roundup + (12960 N (.3)	1,5L	28	glyfosaat (360 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 1 keer per seizoen!	B
	Touchdown Quattro 12552 N (W.2)	1 ltr	-	glyfosaat (360 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 1 keer per seizoen!	B
	RoundUp Dynamic 16394 N (W.-)	1 ltr	28	glyfosaat (500 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 2 toepassingen met 28 dagen interval	B
	Kerb Flo 13152 N (W.4)	2,5 ltr	-	propyzamide	Na-oogst toepassing, toepassen in de herfst of winter, maximaal 1 toepassing per seizoen, alleen onbedekte teelt	
	Devrinol 45 SC 14282 N (W.2)	2,7 ltr	-	napropamide	Bodemherbicide. <b>Niet toegelaten in tunnels en kassen</b> Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar.	B

	Wing P 14881 N (W.1)	3 ltr	-	Dimethenamide-P + pendimethalin	Bodemherbicide. <b>Niet toegelaten in tunnels en kassen</b> Maximaal 1 toepassing per seizoen, waarschijnlijk in het vroege voorjaar.	B
--	-------------------------	-------	---	------------------------------------	--	---

- B\* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, etc. Lees voor gebruik het etiket.
- VT\* = veiligheidstermijn in dagen.
- Pas de dosering (met name bij insecticiden, maar ook bij fungiciden) aan op uw boomhoogte (boomgrootte). De gegeven doseringen zijn voor een volwassen aanplant. Houdt hier rekening mee als u jongere percelen gaat bespuiten.
- Voor alle middelen geldt pas weer in het gewas aan het werk, nadat het gewas is opgedroogd van de bespuiting. Bij gebruik in kassen geldt, eigenlijk voor alle middelen, eerst twee uur ventileren en vervolgens mag de ruimte weer betreden worden. (Zie voor etiketten: [www.fytostat.nl](http://www.fytostat.nl) of [www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl), of overleg met uw voorlichter)
- Binnen een geïntegreerde teelt zoveel mogelijk selectieve middelen inzetten, met geen of weinig effect op natuurlijke vijanden.
- In beschermde teelten is het uitzetten van natuurlijke vijanden een goede optie. Voor meer informatie omtrent eventuele biologische bestrijding neem contact op met uw voorlichter.
- Glyfosaat dosering op basis van liters/ha boomgaard, op de Roundup etiketten staat niet specifiek inzetbaar in steenfruit maar inzetbaar in groot fruit. Zoals hieronder te zien is vallen de kersen en pruimenteelt onder het groot fruit.

<b>3. Fruitgewassen</b>			
<b>Betreft alleen de productieteelt van te oogsten vruchten</b>			
	3.1 Groot fruit		
	3.1.1 Pitvruchten		
		Appel	
		Peer	incl. Japanse peer
		Kweeper	
		Mispel	
		Overige pitvruchten	
	3.1.2 Steenvruchten		
		Kers	Zoete kers Zure kers
		Pruim	Incl. kroosje of kriekpruim
		Abrikoos	
		Perzik Nectarine	
		Overige steenvruchten	