

Toelatingen in de teelt van kersen

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (januari 2025). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden. Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst (www.ctqb.nl) of uw voorlichter. Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.)

TOELATINGEN IN DE TEELT VAN KERS 2025						
Plaaag / ziekte	Middel	Dosering per hectare	VT* (dg)	Actieve stof	Opmerkingen	B*
Bladluizen	Pirimor 5794 N (W.12)	0,5 kg	7	pirimicarb	Alleen onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval. Door driftbeperkingen bij watergangen moeilijk bruikbaar. (alleen toegelaten na 1 mei en dan 99% DRT) Verwachte uitverkoop maart 2026 en opgebruik juni 2026	B
	Movento 13404 N (W.7)	0,5 ltr (max. 0,75 ltr)	21	spirotramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval. <i>Let op met DRT.</i> Opgebruik 30-10-2025	B
	Batavia 15615 (W.6)	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	21	spirotramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Nevenwerking tegen larven van de kersenvlieg. Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval Opgebruik 30-10-2025	B
	Teppeki 12757 (W.12)	140 gram	14	flonicamid	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen, dan alleen na zonsondergang toepassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i> Max. 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval	B
	Afinto 16104 (W.3)	140 gram	14	flonicamid	Zie Tepeki, zelfde werkzame stof, alleen andere fabrikant	B
	NeemAzal-T/S 12455 (W.7)	2 – 3 liter (max. 3 – 4,5 ltr)	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. Voor 1 mei max. 3 ltr/ha, na 1 mei max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
	Oroganic 15958 (W.2)	8 ltr	1	Sinaasappelolie	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Max. 11 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval. Werkt ook op spint	
Groene appelwants	Promanal HP 16278 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	Alle teelten. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij.</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	Paraffineoliën	Alleen onbedekte teelt. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B

Kersenvlieg	Gazelle 12809 N (W.6)	250 gram (max. 375 gr)	14	acetamiprid	Op etiket alleen kersenvlieg. Niet toegelaten in de bedekte teelt. Werkt ook op wantsen, bladluizen en kevers . Max. 2x per seizoen, met 30 dagen interval tussen toepassingen. <i>Voor 1 mei, maximaal 206 gram middel per hectare, toepassen met DRT 95. Max. 1 toepassing voor 1 mei</i>	B
	Movento	0,5 ltr (max. 0,75 ltr)	21	spiroetramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i>	B
	Batavia	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	21	spiroetramat	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt.</i>	
Suzuki fruitvlieg	Exirel 16748 N (W.-)	0,75 ltr	7	cyantraniliprole	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Mag niet in de bloei! Dit middel (deze werkzame stof) mag eens per 3 jaar toegepast worden. Toepassen met DRT 95 en 450 teeltvrij of bij kleiner dan 450 cm teeltvrij minimaal 97,5 DRT <i>Het middel mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden!</i>	B
Rupsen en motten	XenTari WG 12437 N (W.4)	1 kg (max 1,5 kg)	-	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Alleen onbedekte teelt , 10 toepassingen met 6 dagen interval, geen VT	B
	Dipel DF 14674 N (W.1)	1,5 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT	
	Costar WG 15885 N (W.1)	0,3 – 1 kg	-	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Op het etiket: steenfruit breed toegelaten Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT	
	NeemAzal-T/S	2 – 3 liter (max. 3 – 4,5 ltr)	-	azadirachtin	<i>Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.</i> Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. Voor 1 mei max. 3 ltr/ha, na 1 mei max. 4,5 ltr/ha toepassen. Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval <i>In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3</i>	B
	Lalguard M52 OD 14883 (W.1)	1,8 ltr	4 uur	Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52	Bedekte teelt is 10 toepassingen met 3 dagen interval Onbedekte teelt is 6 toepassingen met 7 dagen interval Nevenwerking op spint(mijten), trips en witte vlieg	
Spint – en roestmijten	Cantack 12939 N (W.5)	0,9 ltr	21	acequinocyl	Maximaal 1 toepassing per seizoen, alleen toegelaten voor de onbedekte teelt , toepassen met minimaal 90% DRT!	B
	Scelta 13440 (W.8)	1 ltr	-	cyflumetofen	Toegelaten na de oogst , zowel voor de bedekte en onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval	B
	Vertimec Gold 13087 N (W.11)	0,75 ltr (max. 1,1 ltr)	28	abamectine	Alleen bedekte teelt! Maximaal <u>twee keer</u> , per teeltcyclus toepassen. Het minimale interval is 10 dagen.	B
	Botanigard WP 12612 (W.4)	0,625 kg	1	Beauveria bassiana	Max. 25 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt , werkt ook op trips	
	Botanigard Vlb. 12612 (W.4)	1,25 ltr	1	Beauveria bassiana	Max. 25 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt , werkt ook op trips	

	Futareco Nofly WP 16266 (W.4)	2,5 kg	1	Paecilomyces fumosoroseus stam Fe9901	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Max. 4 toepassingen per seizoen, met 5 dagen interval. Op het etiket staat tegen Witte vlieg en Trips.	
	Lalguard M52 OD 14883 (W.1)	1,2 ltr (max. 1,8 ltr)	4 uur	Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52	Bedekte teelt is 10 toepassingen met 3 dagen interval Onbedekte teelt is 6 toepassingen met 7 dagen interval Nevenwerking op rupsen, trips en witte vlieg	
	Oroganic 15958 (W.2)	8 ltr	1	Sinaasappelolie	Alleen toegelaten in de bedekte teelt. Max. 11 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval. Werkt ook bladluis en meeldauw	
	Neudosan 16452 (W.-)	14 ltr	-	vetzuren en kaliumzouten	Groen middel, alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 5 toepassingen met 5 dagen interval. Geen VT.	
	Eradicoat Max 16056 (W.1)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	maltodextrine	Groen middel, alle teelten! Maximaal 5 toepassingen met 3 dagen interval. Geen VT. Opletten met intensief toepassen!	B
	Siltac SF (Protac)	0,6 ltr	-	siliconenpolymeren	Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter water, altijd een proefbespuiting uitvoeren!	B
	Stix	1 – 1,5 ltr	-	siliconenpolymeren	Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting uitvoeren, bij voorkeur toepassen met maximaal 500 liter per hectare. De maximale dosering is 0,3%.	B
	Promanal HP 16278 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	paraffineoliën	Alle teelten. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij.</i>	B
	Ovitex 16431 N (W.-)	20 ltr (max. 30 ltr)	-	paraffineoliën	Alleen onbedekte teelt. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken. <i>Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij</i>	B
Bladvalziekten	Syllit Flow 400 SC 11647 N (W.4)	1,7 ltr	14	dodine	Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 60 dagen interval. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst	B
	Syllit 544 SC 16287 N (W.-)	1,25 ltr	14	dodine	Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 60 dagen interval. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst	B
	Dodifun SC 16268 N (W.-)	1,7 ltr	14	dodine	Alleen onbedekte teelt, maximaal 1 toepassing. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst	
	Delan DF 10001 N (W.14)	0,75 kg	21	dithianon	Bedekt en onbedekt, max. 4 toepassingen, 3x voor de oogst en 1x na de oogst. Met 7 dagen interval tussen bespuitingen	B
	Signum 12630 N (W.20)	0,75 kg	7	pyraclostrobin + boscalid	Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval. Etiket: tak-en bloesemsterfte en vruchtrot. Niet toegelaten in de bedekte teelt, toepassen met 95% DRT	B
	Flint 12289 N (W.12)	100 gram (max. 150 gr)	14	trifloxystrobine	Etiket: schurft, maar ook effectief tegen bladvalziekte en tak en bloesemsterfte. Alleen onbedekte teelt. Max. 3x met 7 dagen interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha.	B

Schurft	Flint	100 gram	14	trifloxystrobine	Etiket: schurft , maar ook effectief tegen bladvalziekte en tak en bloesemsterfte. Alleen onbedekte teelt. Max. 3x met 7 dagen interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha.	B
Hagelschotziekte	Kumulus S (6147 N W.8)	6 kg (max. 7,5 kg)	7	zwavel	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Vóór 1 mei, alleen toepasbaar met 99% DRT. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. Na 31 mei van het betreffende jaar mag het middel niet meer toegepast worden!!	B
	Thiovit jet (5395 N W.8)	5 kg (max. 7,5 kg)	-	zwavel	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, uitsluitend na de bloei. Vóór 1 mei, alleen toepasbaar met 99% DRT. Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval. Na 31 juli van het betreffende jaar mag het middel niet meer toegepast worden!!	B
	Microthiol Special Liquid (16371 N W.1)	7,3 ltr	-	zwavel	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Toegelaten vanaf 1 mei tot eind juli. Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval. Met DRT 95 en 450 cm teeltvrij of DRT 97,5 bij <dan 450 cm teeltvrij	B
Tak- en bloesemsterfte en vruchtrot	Switch 12819 N (W.8)	0,8 kg (max. 1 kg)	7	cyprodinil + fludioxonil	Breedwerkend middel, met name sterk op Botrytis en Colletotrichem. Niet toegelaten in de bedekte teelt. <i>Bij watergangen geen toelating voor 1 mei.</i> Maximaal 3 toepassingen met een interval van 10 dagen.	B
	Geoxe (Safir) 14414 N (W.4)	400 gr (max. 450 gr)	7	fludioxonil	Alleen onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen interval. Dit middel bevat de fludioxonil uit Switch, dus werkzaam op vruchtrot middels 1 werkzame stof.	
	Luna Experience 14777 N (W.3)	400 ml (max. 600 ml)	7	fluopyram + tebuconazool	Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Luna Privilege 13832 N (W.7)	150 ml	14	fluopyram	Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen twee bespuitingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Signum	0,75 kg	7	pyraclostrobin + boscalid	Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval. Niet toegelaten in de bedekte teelt , toepassen met 95% DRT	B
	Captan Malvin 6782 (W.15)	1,5 kg (max. 2,25 kg)	21	captan	Maximaal 3 toepassingen met een interval van 7 dagen tussen twee toepassingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Teldor 12130 N (W.7)	1 kg (max. 1,5 kg)	3	fenhexamid	Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. <i>Voor 1 mei beperkingen, maar wel bruikbaar.</i> Niet toegelaten in de bedekte teelt	B
	Folicur SC 13057 N (W.7)	300 ml (max. 450 ml)	7	tebuconazool	Max. 2 toepassingen met 21 dagen interval, bedekte en onbedekte teelten. 1 ^e x BBCH 57-69, 2 ^e x BBCH 71-85. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Folicur WG 11765 N (W.9)	0,5 kg (max. 0,75 kg)	7	tebuconazool	Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval, bedekte en onbedekte teelten. 1 ^e x BBCH 57-69, 2 ^e x BBCH 71-85. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Belanty 16459 N (W.-)	1,8 ltr	3	mefentrifluconazool	Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval, alleen onbedekte teelt. Voor 1 mei 99 DRT, na 1 mei 95 DRT.	B

					Maximaal 1 toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden	
	Flint	100 gram	14	trifloxystrobine	Alleen onbedekte teelt. Max. 3 toepassingen met 7 dagen interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha	B
	Serenade 14536 N (W.8)	5 – 8 ltr	-	Bacillus amyloliquefaciens QST 713	Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 5 dagen interval. Alleen onbedekte teelt. Geen VT.	
	Taegro 15794 N (W.2)	0,37 kg	4 uur	Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	Groen middel. Maximaal 12 toepassingen met 3 dagen interval. Alle teelten	
	Amylo-X WG 16011 N (W.1)	2,5 kg	1	Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval. Alle teelten	
	Serifel 15888 N (W.2)	0,5 kg	-	Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600	Groen middel. Maximaal 10 toepassingen met 7 dagen interval. Alleen onbedekte teelt. Geen VT.	
	Fado 14921 N (W.4)	2 ltr	3	COS-OGA	Groen middel, voor de onbedekte teelt , maximaal 8 toepassingen met 8 dagen interval en 3 dagen VT. <i>Bij voorkeur toepassen in menging of in een spuitschema</i>	
	Fado 14921 N (W.4)	3 – 4 ltr	-	COS-OGA	Groen middel, voor de bedekte teelt , maximaal 5 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT.	
	Vacciplant 13383 N (W.3)	1 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de onbedekte teelt , maximaal 20 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Vacciplant 13383 N (W.3)	0,75 ltr	-	laminarin	Groen middel, voor de bedekte teelt , maximaal 7 toepassingen met 10 dagen interval, geen VT.	
	Karma 13854 N (W.7)	5 kg	1	kalium waterstofcarbonaat	Groen middel, maar voer altijd een proefbespuiting uit!! Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval	
	Vintec 15689 N (W.3)	200 gr	1	Trichoderma atroviride strain SC1	Groen middel. Maximaal 4 toepassingen met 7 dagen interval. Alleen onbedekte teelt.	
	Problad 16572 N (W.-)	3,2 ltr	-	Extract van Lupinus albus	Groen middel, ter ondersteuning van andere middelen. Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. Alleen onbedekte teelt.	
Groei regulatie	Kudos 15307 N (W.1)	1,25 kg	20	Prohexadion- calcium	Max. 3 bespuitingen per jaar, met 14 dagen interval. Zowel de bedekte als onbedekt teelt toegelaten.	B
	Valioso ST 14917 N (W.1)	20 tabletten	-	gibberellinezuur	Max. 1 toepassing per seizoen, alleen de onbedekte teelt. Inzet geeft: verhoging van de vruchthardheid, bevordering van de vruchtgrootte en ca. 5 dagen oogstvertraging	
	Novagib 14517 N (W.1)	0,6 – 1,2 ltr	-	gibberellinen	Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Maximaal 1,2 liter per jaar. Of middels 1 toepassing met 1,2 liter per ha of middels 2 toepassingen met 0,6 liter per ha met 3 dagen interval	
Onkruid	Agil 100 EC 15291 N (W.2)	0,75 ltr (max. 1 ltr)	30	propaquizafob	Alleen werking op grassen. Maximaal 1 toepassing per seizoen, op kweekgras wel 2x met max. 0,75 ltr/ha.	B

					Niet toegelaten in tunnels en kassen	
	AZ 500 15264 N (W.2)	0,3 ltr	-	isoxaben	Na oogst toepassing, toepassen in de herfst of winter , maximaal 1 toepassing per seizoen, niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden	B
	Quickdown 13246 N (W.5)	0,8 ltr	-	pyraflufen-ethyl	Alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg bij de toepassing 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe.	B
**	Touchdown Quattro 12552 N (W.2)	1 ltr	-	glyfosaat (360 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 1 keer per seizoen!	B
	RoundUp Dynamic 16394 N (W.-)	1 ltr	28	glyfosaat (500 gr/ltr)	Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 2 toepassingen met 28 dagen interval	B
	Kerb Flo 13152 N (W.4)	2,5 ltr	-	propyzamide	Na-oogst toepassing, toepassen in de herfst of winter , maximaal 1 toepassing per seizoen, alleen onbedekte teelt	B
	Devrinol 45 SC 14282 N (W.2)	2,7 ltr	-	napropamide	Bodemherbicide. Niet toegelaten in tunnels en kassen Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar	B
	Wing P 14881 N (W.1)	3 ltr	-	Dimethenamide-P + pendimethalin	Bodemherbicide. Niet toegelaten in tunnels en kassen Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar.	B

- B* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, maximale dosering, etc.
Lees voor gebruik het etiket!
- VT* = veiligheidsstermijn in dagen.
- Let bij het middel Pirimor op met het zogenaamde "Re- entry". Voor alle andere middelen geldt pas weer in het gewas aan het werk, nadat het gewas is opgedroogd. Bij gebruik in kassen geldt, voor bijna alle middelen, eerst twee uur ventileren en vervolgens mag de ruimte weer betreden worden. (Zie voor etiketten: www.fytostat.nl of www.ctgb.nl, of overleg met uw voorlichter)
- Binnen een geïntegreerde teelt zoveel mogelijk selectieve middelen inzetten, met geen of weinig effect op natuurlijke vijanden.
- In beschermde teelten is het uitzetten van natuurlijke vijanden een goede optie. Voor meer informatie omtrent eventuele biologische bestrijding neem contact op met uw voorlichter.
- **** Dit is een middel op basis van glyfosaat met specifiek kers (steenvrucht) op het etiket. Enkele andere middelen op basis van glyfosaat hebben grootfruit op hun etiket staan. Middels de DTG lijst van juni 2015, versie 2.1 mogen deze middelen dus ook onder kersen. Enkele middelen die dan bijvoorbeeld ook nog onder kersen toegepast mogen worden zijn: Clinic Free en Roundup +.**